



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

03 ФЕВ 2012

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению БутиПЕРЛа™ для стимуляции роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия слизистой оболочки кишечника у поросят и сельскохозяйственных птиц

(организация-производитель: фирма «Eurhema s.r.l.»/«Эурема с.р.л.», Италия)

### I. Общие сведения

1. БутиПЕРЛ™ (ButiPEARL™) – кормовая добавка для стимуляции роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия слизистой оболочки кишечника у поросят и сельскохозяйственных птиц.

2. БутиПЕРЛ™ содержит: бутират кальция (45,0-55,0 %), гидрогенизированного пальмового жира (44,9-54,9 %), ванилина (0,05-0,15 %).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. БутиПЕРЛ™ представляет собой микрокапсулы от белого до кремового цвета.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, состава и гарантированных показателей, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, массы нетто, номера партии, даты производства, срока и условий хранения, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C.

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Кормовую добавку БутиПЕРЛ™ запрещается использовать по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства БутиПЕРЛа™ обусловлены входящими в состав компонентами. Бутират кальция защищает целостность слизистой оболочки кишечника, стимулирует рост ворсинок, помогает быстро восстанавливать стенку кишечника при повреждении, предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов через стенку кишечника. Благодаря этому улучшается рост животных, конверсия корма и сохранность поголовья.

Специальная технология инкапсулирования активных ингредиентов БутиПЕРЛа™ позволяет бутирату кальция без потерь проходить верхние отделы желудочно-кишечного тракта и активно действовать непосредственно в кишечнике.



### III. Порядок применения

6. БутиПЕРЛ™ применяют для стимуляции роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия слизистой оболочки кишечника у поросят и сельскохозяйственных птиц.
7. БутиПЕРЛ™ вносят в комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода составляет:

для поросят с момента отъёма до десятидневного возраста - 1000-1500 г/т корма;

для бройлеров и кур-несушек в течение всего периода выращивания - 200-300 г/т корма.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. БутиПЕРЛ™ совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию от животных и птиц после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

11. При работе с БутиПЕРЛом™ необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей.

12. БутиПЕРЛ™ следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Кемин Индастриз» (г. Москва) совместно с фирмой «Eurhema s.r.l.» (Италия)

Адрес организации-производителя: Via G. Leopardi, 2/C – 42025 CAVRIAGO (RE) – Italy.

Рекомендована к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВИ-2-01.12/03642