



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Асид Лака ХТ сухого для подкисления кормов для
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель: фирма «Кемин Европа Н.В.»/«Kemin Europa N.V», Бельгия)

I. Общие сведения

1. Асид Лак ХТ сухой (Acid Lac ХТ dry) – кормовая добавка для подкисления кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.
2. Асид Лак ХТ сухой содержит в качестве действующих веществ молочную кислоту (17,0-23,0 %), муравьиную кислоту (7,5-11,5 %), фумаровую кислоту (13,0-17,0 %), лимонную кислоту (8,0-12,0 %), а также наполнители кремнезем (22,0-28,0 %) и кристобалит (10,0-14,0 %). Влажность добавки может колебаться от 5,5 до 11,5 %.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. Представляет собой сыпучий порошок бежевого цвета плохо растворимый в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, состава и гарантированных показателей кормовой добавки, назначения и способа применения, массы нетто, номера партии, даты производства, срока и условий хранения, информации о соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C.

Запрещается использовать добавку по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Асид Лак ХТ сухой снижает уровень рН в кормах, а также в желудке и кишечнике животных и приводит к приостановке развития таких патогенных бактерий как сальмонеллы, кишечные палочки и другие. При этом рост и размножение полезной молочнокислой микрофлоры не угнетается.

Применение кормовой добавки способствует формированию благоприятной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте животных и птиц, улучшает их здоровье, снижает смертность, повышает рост и снижает затраты кормов.

III. Порядок применения

6. Асид Лак ХТ сухой применяют для подкисления кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

7. Асид Лак ХТ сухой вносят в комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода составляет 2,0-5,0 кг/т корма.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. Асид Лак сухой совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками, хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Асид Лаком ХТ сухим необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать средства защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

12. Оказание первой помощи пострадавшим: при вдыхании – вывести на открытый воздух, при попадании на кожу и в глаза – промыть большим количеством проточной воды.

13. Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы и в канализацию в неразбавленном виде или в больших количествах.

14. Асид Лак ХТ сухой следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Кемин Индастриз», (г. Москва) совместно с фирмой «Кемин Европа Н.В.» (Бельгия)

Адрес организации производителя: «Kemin Europa N.V.», Industriezone Wolfstee, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals, Belgium.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная 30 июня 2006 года.

Регистрационный номер: ПВИ-2-36/01879