УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ А. НЕПОКЛОНОВ
21 ИЮЛ 2014

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Лисофорта Бустера сухого для повышения переваримости и усваиваемости питательных веществ в рационах свиней, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры

(организация-производитель: фирма «Кемин Европа Н.В.»/ «Kemin Europa N.V.» Бельгия)

I. Общие сведения

1. Лисофорт Бустер сухой (Lysoforte Booster dry) – кормовая добавка для повышения переваримости и усваиваемости питательных веществ в рационах свиней, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры.

2. Лисофорт Бустер сухой в каачестве действующего вещества содержит лецитин (45,0-55,0%), а также вспомогательные вещества: двуокись кремния (27,0-33,0 %) и известняк (14,0-26,0 %).

Лисофорт Бустер сухой не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. Кормовая добавка по внешнему виду представляет собой сыпучий порошок бежевого цвета, не растворимый в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия, назначения и способа применения добавки; состава и гарантированных показателей; массы нетто; номера партии; даты изготовления; срока и условий хранения; информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Лисофорт Бустер сухой запрещается использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Лисофорт Бустер сухой улучшает усвоение питательных веществ корма у свиней, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры. Ускоряет образование водно-жировой эмульсии в кишечнике, способствует гидролизу жиров и формированию мицелл в кишечнике, улучшает всасывание жиров и других питательных веществ корма.