



ИНСТРУКЦИЯ
по применению ЛизиПЕРЛTM в качестве источника лизина,
защищённого от разрушения в рубце, для жвачных

(организация-производитель: фирма «Eurhema s.r.l.»/«Эурема с.р.л.», Италия)

I. Общие сведения

1. ЛизиПЕРЛTM (LysiPEARLTM) – кормовая добавка в качестве источника лизина, защищённого от разрушения в рубце, для жвачных.

2. ЛизиПЕРЛTM содержит: L-лизин моногидрохлорид (47,5 – 52,5 %), полученный микробиологическим синтезом (штамм-продуцент *Corynebacterium glutamicum*), гидрированный пальмовый жир (47,5 – 52,5 %).

Кормовая добавка ЛизиПЕРЛTM не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. Представляет собой микрокапсулы светло-коричневого цвета.

4. Выпускают расфасованной по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия кормовой добавки, назначения, массы в кг, даты изготовления, номера партии, срока и условий хранения, обозначения технических условий, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.

Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Кормовую добавку ЛизиПЕРЛTM запрещается использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. В состав ЛизиПЕРЛTM включён L-лизина моногидрохлорид, который благодаря специальной технологии микрокапсулирования защищён от разрушения в рубце. Лизин – это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков. Микрокапсулированный лизин не разрушаясь минует рубец и достигает кишечника, где капсула разрушается и лизин становится доступным для всасывания в кишечнике.

III. Порядок применения

6. Добавку кормовую ЛизиПЕРЛ™ применяют в качестве источника лизина защищённого от разрушения в рубце для жвачных.

7. ЛизиПЕРЛ™ вносят в комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода:

- для молочного скота – 20 – 100 г/голову/день;
- для мясного скота – 20 – 30 г/голову/день;
- для овец и коз – 5 – 20 г/голову/день.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. ЛизиПЕРЛ™ совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками, хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

10. Продукцию от животных после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с ЛизиПЕРЛом™ необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

12. Добавку кормовую ЛизиПЕРЛ™ следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Кемин Индастриз» (г. Москва) совместно с фирмой «Eurhema s.r.l.» (Италия)

(Адрес организации-производителя: Via G. Leopardi, 2/C – 42025 CAVRIAGO (RE) – Italy)

Рекомендована к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-24.11/03592