



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению добавки кормовой **Энзим – Комплекс** для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и птиц на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.  
(организация-производитель фирма ООО «ТД Кормовые Добавки», Россия)

### I. Общие сведения

1. **Энзим-Комплекс** - добавка кормовая для повышения перевариваемости питательных веществ в рационах свиней и птиц на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.
2. **Энзим-Комплекс** содержит: ферменты - ксиланазу с активностью не менее 20000 ед/г, бетта-глюканазу с активностью не менее 2350 ед/г, целлюлазу с активностью не менее 4000 ед/г, протеазу с активностью не менее 450 ед/г, и амилазу с активностью не менее 400 ед/г, бентонит-монтмориллонит.

Кормовая добавка **Энзим-Комплекс** не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. Представляет собой сыпучий порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую упаковку маркируют с указанием названия добавки, фирмы-изготовителя, даты выпуска, номера серии, срока годности, условий хранения.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C.

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления.

### II. Биологические свойства

5. **Энзим-Комплекс** содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение кормов. В результате использования **Энзим-Комплекса** повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.

### III. Порядок применения

6. **Энзим-Комплекс** применяют для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и птиц на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.

7. **Энзим-Комплекс** вносят в кормовое сырье или комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода составляет - 500 - 1000 г/т корма.

**Энзим-Комплекс** сохраняет активность после грануляции при максимальной температуре 85°C.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. **Энзим-Комплекс** совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками, хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.



10. Продукцию животноводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики**

11. При работе с **Энзим-Комплексом** необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

12. **Энзим-Комплекс** следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана фирмой ООО «ТД Кормовые Добавки»  
